



La OMS centra su lucha contra el sida en comunidad homosexual



Foto: EFE

De acuerdo con un informe, este colectivo tiene 20 veces más posibilidades de contraer el VIH.

Por primera vez, y luego de treinta años de detectados los primeros casos de sida, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publica guías sobre cómo abordar el tema de la prevención y el tratamiento del colectivo homosexuales y transexuales, que presenta 20 veces más probabilidades de contraer el VIH, que causa el sida.

De acuerdo con un informe de la OMS sobre el tema, divulgado en Ginebra (*Suiza*), en países como Bolivia, Jamaica, México, Birmania, Tailandia, Trinidad y Zambia, el porcentaje de homosexuales infectados con VIH sobrepasa el 20 por ciento, y en algunos casos alcanza incluso el 40 por ciento.

En el caso de los transexuales, las tasas de contagio varían entre un 8 y un 68 por ciento, dependiendo del país, aunque en muchos casos los datos no son fiables porque este colectivo no está reconocido legalmente.



La OMS recordó también que en muchos países los homosexuales y transexuales están estigmatizados, lo que determina que estas personas no acudan a los servicios de atención médica a recibir tratamiento por miedo a ser humillados o acosados y a que se rompa la confidencialidad médico-paciente.

Por si fuera poco, más de 75 países criminalizan a los homosexuales y transexuales, privándolos de derechos fundamentales, como la atención médica.

Según los datos por regiones, la prevalencia de infecciones de VIH entre homosexuales en el África Subsahariana oscila entre el 6 y el 31 por ciento, mientras que en Asia los homosexuales tienen 18 veces más probabilidades de contraer el VIH que la población en general. En Latinoamérica, alrededor de la mitad de los contagios de VIH se producen entre homosexuales.

Las recomendaciones recogidas en el informe van dirigidas a los políticos, al personal sanitario para asegurar la correcta atención médica a los contagiados y al colectivo homosexual y transexual para fomentar la prevención, usando siempre preservativo. Además del impulso de políticas educativas y de integración, la OMS pide también al personal sanitario de todos los países que ofrezcan pruebas y orientación sobre la infección y faciliten el tratamiento.

"No podemos reducir la propagación de la infección por VIH en el mundo a menos que se atiendan las necesidades particulares de estos grupos de población clave al respecto", declaró el director del departamento de VIH/Sida de la OMS, Gottfried Hirnschall. Las nuevas directrices de la OMS se prepararon durante el año pasado mediante consultas mundiales en las que intervinieron funcionarios de salud pública, científicos y representantes de organizaciones donantes, de la sociedad civil y de los proveedores de servicios de salud.

GINEBRA
EFE

ELTIEMPO.COM /