











# Tabla de medicamentos para el tratamiento del VIH



Esta tabla de medicamentos incluye todas las drogas aprobadas para el tratamiento del VIH para personas con VIH. La tabla contiene información del nombre del medicamento, las dosis, e información importante de efectos no deseados. Para más información, lea la información de cada uno de los medicamentos provisto en el empaque de cada uno. Sense es una publicación en línea del MSMGF: [www.msmsgf.org](http://www.msmsgf.org)

## Análogos nucleótidos/nucleósidos inhibidores de la transcriptasa reversa (INTR)










	Medicamento	Dosis	Efectos Secundarios Y otra información importante
	<b>Emtriva</b> Gilead Sciences Genérico: emtricitabine	1 cápsula de 200 mg una vez al día. Disponible en formulación líquida.	Efectos colaterales: Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, enrojecimiento y decoloración de la piel de leve a moderada. Puede tomarse con o sin comida. Emtriva® es muy similar a Epivir®. Pacientes que son resistentes a Epivir®, probablemente lo son a Emtriva®.
	<b>Epivir</b> ViiV Healthcare Genérico: lamivudine	1 tableta de 300 mg una vez al día ó 1 tableta de 150 mg dos veces al día. Disponible en formulación líquida.	Efectos colaterales: Dolor de cabeza, fatiga, náuseas, diarrea, insomnio, bajo conteo de células blancas (neutropenia) y células rojas (anemia), pancreatitis, pérdida del cabello. Puede "revertir" la resistencia del VIH al AZT si se usan conjuntamente. Evite consumo de alcohol. Controlar, triglicéridos, especialmente en niños por riesgo de pancreatitis. Puede tomarse con o sin comida.
	<b>Retrovir</b> ViiV Healthcare Genérico: zidovudine	1 tableta de 300 mg dos veces al día. Disponible en formulación líquida.	Efectos colaterales: Bajo conteo de células rojas (anemia), neutropenia, dolor de cabeza, náuseas, dolor, inflamación y daño muscular; decoloración de las uñas. Tenga precaución con la anemia. Puede tomarse con o sin comida. Al tomarlo con comida se pueden reducir las molestias estomacales. Evite tomarlo conjuntamente con Zerit®. También utilizado para prevenir la transmisión de madre a hijo.
	<b>Videx EC</b> Bristol-Myers Squibb Genérico: didanosine	1 cápsula recubierta de 400 mg una vez al día ó 1 cápsula de 250 mg con peso inferior a 132 libras (60kg). Disponible en formulación en polvo.	Efectos colaterales: Neuropatía periférica, hormigueo, adormecimiento o dolor en las manos y en los pies, cambios en la retina, pancreatitis, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, vómitos, sequedad de la piel. Ambas formulaciones deben tomarse por lo menos una hora antes de comer o dos horas después de haber comido. Evite el uso de tabletas antiácidas que contengan aluminio si está tomando la formulación en tabletas o en polvo. Cuando se combina con Viread® se debe reducir la dosis a 250 mg al día.
	<b>Viread</b> Gilead Sciences Genérico: tenofovir DF	1 tableta de 300 mg una vez al día.	Efectos colaterales: Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza y osteopenia. Controlar la función de los riñones. Se puede tomar con o sin comida. Si se combina con Videx®, reducir la dosis de Videx® a 250 mg al día.
	<b>Zerit</b> Bristol-Myers Squibb Genérico: stavudine	1 cápsula de 40 mg dos veces al día. Peso 132 libras (60 kg) o menos 1 cápsula de 30 mg dos veces al día.	Efectos colaterales: Neuropatía periférica, hormigueo, adormecimiento o dolor en las manos y pies, pancreatitis, insomnio, dolor de cabeza, náuseas y diarrea. Cierta evidencia sugiere que no debe tomarse conjuntamente con AZT. Se puede tomar con o sin comida.
	<b>Ziagen</b> ViiV Healthcare Genérico: abacavir sulfate	1 tableta de 300 mg dos veces al día ó 2 tabletas de 300 mg una vez al día. Disponible en formulación líquida.	Efectos colaterales: Reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica seria), náuseas, vómitos, dificultad para respirar, dolor abdominal, fiebre y/o erupciones cutáneas. Las personas que padecen estos efectos colaterales dentro de las seis semanas después de haber comenzado a tomar Ziagen®, pueden estar padeciendo una reacción de hipersensibilidad y deben contactar a su médico inmediatamente. Ante el diagnóstico de reacción alérgica se debe discontinuar la medicación. Una vez que usted deja de tomar Ziagen®, no debe volver a tomar este medicamento debido a que podría ser fatal. Se puede tomar con o sin comida.

## Análogos no nucleósidos inhibidores de la transcriptasa reversa (INNTR)



	<b>Edurant</b> Janssen Therapeutics Genérico: Rilpivirine	Una tableta de 25 mg una vez al día.	Efectos secundarios: depression, elava la función del hígado. Podría ser menos potente si la línea basal es de RNA de VIH es > 100,000 copias / mL. Requiere de un ambiente ácido gástrico para una absorción adecuada. Se debe tomar con comida.
	<b>Intelence</b> Janssen Therapeutics Genérico: Etravirine	2 tabletas de 100 mg dos veces al día.	Reacciones cutaneas severas, casos de síndrome de Stevens-Johnson, reacciones de hipersensibilidad. Descontinuar uso si se desarrolla sarpullido severo. Debe tomarse después de una comida. Intelence no debe administrarse con los siguientes antirretrovirales: Tipranavir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir; inhibidores de la proteasa que no contengan ritonavir y los INNTR.
	<b>Rescriptor</b> ViiV Healthcare Genérico: Delavirdine mesylate	2 tabletas de 200 mg tres veces al día.	Efectos colaterales: Erupción cutánea, dolor de cabeza, fatiga, náuseas, elevación de enzimas hepáticas. Debe tomarse por lo menos una hora antes o después de haber tomado Videx® o tabletas antiácidas. Eleva los niveles en sangre de algunos inhibidores de la proteasa. Notifique a su médico si padece una erupción cutánea. Puede tomarse con o sin comida.

	<b>Sustiva</b> Bristol-Myers Squibb Genérico: efavirenz (en algunos países se vende como Stocrin)	1 cápsula de 600 mg una vez al día ó 3 cápsulas de 200 mg una vez al día.	Efectos colaterales: Síntomas relacionados con el sistema nervioso central (SNC): mareos, somnolencia, insomnio, sueños vívidos, deterioro de la concentración, sensación de inestabilidad y erupción cutánea. Tomar Sustiva® antes de acostarse para minimizar los posibles efectos colaterales. Puede reducir los niveles en sangre de algunos IP y aumentar otros. Rifampin y clarithromycin reducen los niveles de Sustiva®. Evitar consumo de alcohol y tareas de concentración. Las mujeres deberían practicar control para la natalidad debido al riesgo de daño al feto. Evite comidas altas en contenido graso. Preferiblemente tomar con el estómago vacío.
	<b>Viramune</b> Boehringer-Ingelheim Genérico: Nevirapine	1 tableta de 200 mg dos veces al día. Disponible en formulación líquida.	Efectos colaterales: Erupción cutánea, problemas estomacales, dolor de cabeza, bajo conteo de células blancas, elevación de las enzimas hepáticas. Dosis de comienzo: 1 tableta de 200 mg 1 vez al día durante los primeros 14 días. Disminuye los niveles de los IP. Notifique a su médico si padece erupción cutánea. Puede tomarse con o sin comida. Las enzimas hepáticas deben controlarse, especialmente durante el embarazo. Cuando se inicia el tratamiento con Viramune® tener precaución con los recuentos de células T. No recomendable en mujeres que tengan recuentos superiores a 250 células y en hombres superiores a 400 células.


## Inhibidores de la proteasa (IP)

	<b>Aptivus</b> Boehringer-Ingelheim Genérico: tipranavir	2 cápsulas de 250 mg con 2 cápsulas de 100 mg de Norvir® dos veces al día.	Efectos colaterales: Náusea, vómitos, diarrea, erupción cutánea. Tomarlo con comida. Precaución en pacientes con hepatitis. No recomendado en insuficiencia hepática moderada a grave. Aptivus puede ocasionar hemorragia intracraneal. Insuficiencia hepática. Consulte inmediatamente con su médico si presenta sangrado de manera inusual o sin causa que lo justifique. Precaución en alérgicos a sulfas. Funciona mejor cuando se lo combina con Fuzeon®. Solamente para pacientes con experiencia en tratamientos. Tomarlo con comida.
	<b>Crixivan</b> Merck & Co. Genérico: indinavir sulfate	2 cápsulas de 400 mg con 1 ó 2 cápsulas de Norvir® dos veces al día.	Efectos colaterales: Cálculos en los riñones (puede presentarse como dolor de espalda o flanco), elevación en los niveles de la bilirrubina (pigmento biliar), erupción cutánea, piel seca, pérdida del pelo, náuseas y diarrea. Tomar con agua (6 a 8 vasos de agua al día) para evitar los cálculos renales. Junto con Norvir® se puede tomar con o sin comida. Tiene variadas interacciones medicamentosas, consulte a su médico. No se recomienda combinarlo con atazanavir.
	<b>Invirase</b> La Roche Genérico: saquinavir mesylate	2 tabletas de 500 mg con 1 cápsula de 100 mg de Norvir® dos veces al día.	Efectos colaterales: Náusea, diarrea, gas, dolor abdominal, dolor de cabeza. Tomar con comida o dentro de las dos horas de haber comido. Invirase® no debe utilizarse sin Norvir®. Leer interacciones de Norvir®.
	<b>Kaletra</b> Laboratorios Abbott Genérico: 200 mg de lopinavir + 50 mg de ritonavir (se vende como Aluvia en algunos países)	4 tabletas una vez al día; ó 2 tabletas dos veces al día	Efectos colaterales: Deyecciones blandas, diarrea, náuseas, vómitos, sensación de cansancio o debilidad. Este fármaco contiene Norvir® – presenta muchas interacciones medicamentosas. Precaución en pacientes coinfectados con hepatitis B ó C. No hay restricciones alimentarias. Las tabletas no necesitan de refrigeración. La dosis de una vez al día, sólo se recomienda para pacientes sin experiencia previa en tratamientos. Si el régimen contiene Sustiva® o Viramune®, la dosis de Kaletra se debe modificar. La dosis de dos veces al día, sólo se recomienda para pacientes que tienen experiencia en tratamientos y han fracasado con otros medicamentos. Si el régimen contiene Sustiva® ó Viramune®, la dosis de Kaletra se debe modificar.
	<b>Lexiva</b> ViiV Healthcare Genérico: Fosamprenavir (también se vende como Telzir en algunos países)	2 tabletas de 700 mg 2 veces al día; ó 1 tableta de 700 mg con una cápsula de Norvir® de 100 mg 2 veces al día; ó 2 tabletas de 700 mg con una cápsula de Norvir® de 100 mg una vez al día.	Efectos colaterales: Diarrea, náuseas, vómitos, erupción, dolor de cabeza, diabetes. Se puede tomar con o sin comida. La dosis combinada con Norvir® es para pacientes con experiencia en IP y la dosis recomendada es dos veces al día. Lexiva® contiene compuestos derivados de sulfas.
	<b>Norvir</b> Laboratorios Abbott Genérico: ritonavir	6 cápsulas de gelatina blanda de 100 mg dos veces al día. Aprobado también en dosis peditátricos (1 mes a 2 años de edad).	Efectos colaterales: Náuseas, diarrea, dolor abdominal, debilidad, mareos, adormecimiento alrededor de la boca, alteraciones del gusto, aumenta los niveles de triglicéridos y colesterol. Debe tomarse con comida. Norvir® interacciona con otros medicamentos. Separe la dosis de Videx® por lo menos en dos horas. Refrigeración. Si se expone a temperatura ambiente consumir dentro de los 30 días.
	<b>Prezista</b> Janssen Therapeutics Genérico: darunavir	2 tabletas de 300 mg con una cápsula de Norvir® de 100 mg, dos veces al día.	Efectos colaterales: Náuseas, diarrea, dolor de cabeza, inflamación de la garganta y nariz (síntomas parecidos a un resfrío). En algunos casos, erupción cutánea de moderada a grave. Puede causar aumentos de los lípidos y glucosa (azúcar) en la sangre. Precaución en pacientes con hemofilia y pacientes alérgicos a las sulfas. Se debe tomar con comida (no importa la cantidad o calidad de alimentos). Aprobado sólo para pacientes con experiencia previa en tratamientos anti-VIH. Se puede conservar a temperatura ambiente.
	<b>Reyataz</b> Bristol-Myers Squibb Genérico: atazanavir	2 cápsulas de 200 mg una vez al día. 1 cápsula de 300 mg más 1 cápsula de Norvir® una vez al día, para pacientes con experiencia en tratamientos.	Efectos colaterales: Hiperbilirrubinemia (reversible con la suspensión del medicamento), alteraciones del ritmo cardíaco, hiperglicemia, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, adormecimientos y sensación de hormigueo en manos y pies, dolor articular, cálculos renales. Tomarlo con comida. A diferencia de otros IP, Reyataz® no altera los lípidos en sangre. Cuando se toma junto con Sustiva® o Viread®, agregar Norvir® al regimen de Reyataz®. En esta dupla Reyataz® se debe reducir a 300 mg al día (Reyataz® 300 mg /Norvir® 100 mg). No combinar Reyataz® con Crixivan®. Tomarlo 2 horas separado de antiácidos, 10 horas después de los
	<b>Viracept</b> ViiV Healthcare Genérico: nelfinavir	2 tabletas de 625 mg ó 5 tabletas de 250mg dos veces al día. Disponible formulación en polvo.	Efectos colaterales: Diarrea, náuseas, erupción cutánea, dolor de cabeza, calambres estomacales. Tomar con comida, mejora su absorción. Tiene ciertas interacciones medicamentosas. Advertencia: hasta nuevo aviso, debido a impurezas en la tableta no se recomienda para niños que recién comienzan tratamiento, ni tampoco para mujeres embarazadas.







## Inhibidores de la fusión y entrada

	<p><b>Fuzeon</b> Roche y Trimeris. Inc. Genérico: enfuvirtide</p>	<p>1 inyección (1ml/cc) subcutánea cada 12 horas.</p>	<p>Efectos colaterales: Reacción alérgica en el sitio de inyección: Picazón, hinchazón, enrojecimiento, dolor, dureza (generalmente, la reacción se repite en el siguiente sitio de inyección). Reacción alérgica generalizada: problemas para respirar, fiebre, vómitos, sangre en orina, hinchazón de los pies, neumonía, constipación, pancreatitis, dolor muscular, disminución del apetito, observados en combinación con otros antirretrovirales. No hay restricciones alimentarias. Las ampollas de Fuzeon® y de agua esterilizada se pueden conservar a temperatura ambiente, 59F a 86F (15C-30C). Si la temperatura ambiente es superior, se recomienda guardar Fuzeon® en refrigerador; una vez que es combinado con el agua esterilizada, se puede conservar en heladera por 24hs. Fuzeon® sólo está aprobado para su uso en pacientes experimentados en terapia antirretroviral.</p>
	<p><b>Selzentry</b> ViiV Healthcare Genérico: maraviroc (se vende con el nombre de Celsentri en algunos países)</p>	<p>1 tableta de 150 mg dos veces por día, ó 1 tableta de 300 mg dos veces por día ó 2 tabletas de 300 mg dos veces por día (la dosis prescripta dependerá de su combinación con otros medicamentos)</p>	<p>Efectos colaterales: tos, fiebre, resfriados, sarpullido, dolor muscular y articular, dolor de estómago y mareos. Menos frecuente: problemas en el hígado, infartos del corazón, hipotensión postural, riesgo teórico de desarrollo de infecciones o cánceres. Se puede tomar con o sin alimentos. Combinar con otros antirretrovirales. Aprobado para pacientes adultos con experiencia previa y fracaso en tratamientos que tengan un VIH-1 con tropismo CCR5 detectable y resistente a múltiples antirretrovirales. Realizar análisis de tropismo previo al uso de Selzentry para determinar receptor celular (CCR5 ó CXCR4).</p>

## Inhibidor de la integrasa

	<p><b>Isentress</b> Merck &amp; CO. Inc. Genérico: raltegravir</p>	<p>1 tableta de 400 mg dos veces por día.</p>	<p>Efectos colaterales: diarrea, náuseas, dolor de cabeza. Menos comunes: elevaciones de la creatinquinasa (CK), junto con miopatía y rabdomiólisis (destrucción muscular). Se puede tomar con o sin alimentos. Combinar con otros antirretrovirales. Aprobado para pacientes adultos con experiencia previa y fracaso en tratamientos y con cepas de VIH-1 resistentes a múltiples antirretrovirales. Precaución cuando se administra junto con inductores de la enzima UGT (por ej: rifampin) porque los niveles de raltegravir disminuyen.</p>
---	--	---	---

## Combinaciones

	<p><b>Atripla</b> Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences contiene 600 mg de efavirenz + 200 mg de emtricitabine + 300 mg de tenofovir DF. Dos clases de medicamentos (1 INNTR + 2 INTR)</p>	<p>1 tableta una vez al día.</p>	<p>Efectos colaterales: Para información sobre los efectos indeseables lea Sustiva® (efavirenz), Emtriva® (emtricitabine) y Viread® (tenofovir DF). Se debe tomar sin comida y antes de acostarse para minimizar la aparición de potenciales efectos secundarios. Conservar a temperatura ambiente.</p>
	<p><b>Combivir</b> ViiV Healthcare contiene 150 mg de lamivudine + 300 mg de zidovudine (2 INTR)</p>	<p>1 tableta dos veces al día.</p>	<p>Para mayor información sobre efectos colaterales, lea Retrovir® (AZT) y Epivir® (3TC). Tenga precaución con la anemia. Las combinaciones ya establecidas no deben ser prescriptas en pacientes que necesitan ajustes en las dosis. Puede tomarse con o sin comida. Al tomarlo con comida se reducen las molestias estomacales.</p>
	<p><b>Complera</b> GILEAD Sciences and Janssen Therapeutics contiene rilpivirine 25 mg + tenofovir DF 300 mg + emtricitabine 200 mg (1 NNRTI y 2 NRTI)</p>	<p>1 tableta una vez al día.</p>	<p>Los efectos secundarios más comunes son: problemas para dormir, sueños anormales, dolor de cabeza, mareos, diarrea, náuseas, comezón, cansancio, depresión, vómito, y dolor estomacal. Efectos menos comunes: problemas de los riñones, problemas con los huesos (dolor de huesos, adelgazamiento de los huesos lo cual podría causar fracturas de hueso), y cambios en grasa corporal. Para más información vea los efectos secundarios de Edurante, Viread y Emtriva. Complera está aprobada solamente para personas con VIH que nunca han recibido tratamiento. Si usted está tomando Complera, no debería tomar otros medicamentos que incluyan emtricitabine o lamivudine.</p>
	<p><b>Epzicom</b> ViiV Healthcare contiene 600 mg de abacavir + 300 mg de lamivudine (2 INTR) (se vende bajo el nombre de Kivexa en algunos países)</p>	<p>1 tableta dos veces al día.</p>	<p>Para más información sobre efectos colaterales, lea Ziagen® y Epivir®. Se puede tomar con o sin comida. Este medicamento contiene Ziagen® (abacavir) y puede causar una seria reacción alérgica (lea las recomendaciones para Ziagen®).</p>
	<p><b>Trizivir</b> ViiV Healthcare contiene zidovudine 300 mg + lamivudine 150 mg + abacavir 300 mg (3 INTR)</p>	<p>1 tableta dos veces al día.</p>	<p>Para mayor información sobre efectos colaterales, vea Retrovir® (AZT), Epivir® (3TC) y Ziagen® (abacavir). Este medicamento contiene Ziagen® (abacavir) y puede causar una seria reacción alérgica (lea las recomendaciones para Ziagen®). Puede tomarse con o sin comida.</p>
	<p><b>Truvada</b> Gilead Sciences contiene 300 mg de tenofovir DF + 200 mg de emtricitabine (2 INTR)</p>	<p>1 tableta una vez al día.</p>	<p>Para más información sobre efectos colaterales, vea Viread® y Emtriva®. Se puede tomar con o sin comida.</p>